

על קשריות בלוטת התריס |

קשריות בבלוטת התריס הן גידולים שכיחים בבלוטה. שכיחותן עולה עם הגיל והן נפוצות יותר בקרב נשים לעומת גברים. מרבית הקשריות בבלוטת התריס הן שפירות, הן אינן גורמות לכל בעיה בריאותית, והטיפול הנדרש הוא מעקב בלבד. כ-5% מכלל הקשריות המתגלות הן סרטניות (ממאירות)¹. האתגר הגדול הוא להבדיל בין קשריות שאינן מהוות סיבה לדאגה לבין קשריות סרטניות שיש לטפל בהן.

כיצד מתבצע אבחון קשריות |

הכלי העיקרי לאבחון קשריות בבלוטת התריס הוא ביופסיית מחט עדינה (FNA). בדיקה זו מתבצעת לרוב בקשריות גדולות מס"מ אחד שהן בעלות ממצאים חשודים בהדמיית אולטרסאונד.

הדגימה נשלחת לבדיקה ציטופתולוגית, ובמרבית המקרים ניתן לשלול או לאשש נוכחות של סרטן בדרך זו.

מניתוחים
70%-80%
אלו מתבררים כמיותרים -
הקשריות מתגלות כשפירות
לאחר ניתוח³

המקרים **מרבית**
האלו יופנו לניתוח
אבחנתי, כדי לשלול
חשד לממאירות³

ב- **15%-30%**
מבדיקות ה-FNA
מתקבלת תוצאה
שאינה חד-משמעית²

**בדיקת Afirma GSC היא בדיקה אבחנתית מתקדמת
המאפשרת לצמצם את אי-הוודאות ולהימנע
מניתוחים מיותרים**

Afirma GSC היא בדיקה מולקולרית המבוססת על ריצוף RNA ואלגוריתם ייחודי, המאפשרים לשלול ממאירות בקשריות בעלות אבחנה שאינה חד-משמעית בביופסיה.

הבדיקה שוללת ממאירות בוודאות גבוהה מ-96% ומסייעת לרופא בהחלטה להימנע מניתוח ולהסתפק במעקב בלבד⁴.

2 מכל 3 מטופלים מאובחנים כבעלי קשרית שפירה
בבדיקת Afirma GSC **ויכולים להמנע מניתוח מיותר**⁵



יעילות הבדיקה הוכחה קלינית בלמעלה מ-30 מחקרים עצמאיים במרכזים רפואיים שונים ✓

למעלה מ-150,000 ניתוחים נמנעו בזכות בדיקת אפירמה⁵ ✓

בדיקת אפירמה נתמכת ע"י ההנחיות הקליניות לטיפול של האיגודים הגדולים בעולם כמו ATA ו-NCCN ✓

| בדוח תוצאת בדיקת Afirma GSC תקבל אחת משתי התשובות הבאות:

1. קשרית שפירה (Benign)

2. קשרית חשודה בממאירות (Suspicious)*

*דגימות מקשריות שיוגדרו כחשודות בממאירות באמצעות הבדיקה, ייבחנו בנוסף באמצעות פאנל XA, הפאנל הגנומי הרחב ביותר בתחום התיירואיד, שבוחן שינויים גנומיים עם קשר לטרטן בלוטת התריס. פאנל XA מספק לרופא מידע בעל חשיבות קלינית המאפשר טיפול מותאם אישית.⁶

Afirma Genomic Sequencing Classifier

פתרון פשוט לבעיה מורכבת

מתי בדיקת Afirma GSC משתלבת בתהליך האבחון?



למי מתאימה בדיקת אפירמה?

הבדיקה מתאימה למבוגרים מעל גיל 21 עם קשרית בבלוטת התריס שגודלה מעל 1 ס"מ, שמעוניינים להימנע מניתוח אבחנתי בבלוטת התריס לאחר אבחון עם תוצאה ציטולוגית שאינה חד-משמעית (בת'סדה 3 או 4)⁴.

כיצד אקבל תשובה לבדיקה?

דו"ח תשובה לבדיקה מתקבל אצל הרופא המטפל עד כ-3 שבועות משליחת הדגימה למעבדה בארה"ב. הרופא המפנה יסביר לך את התוצאות ואת ההשלכות הרפואיות שלהן.

האם הבדיקה ממומנת על ידי קופות החולים וחברות הביטוח?

קיימים החזרים דרך הביטוחים המושלמים של חלק מקופות החולים. קבלת החזר כספי מחברות הביטוח היא בהתאם לפוליסה של כל נבדק, חברת כצט מסייעת בהבהרת הזכאות לנבדקים המעוניינים להגיש בקשת החזר.

1. Hegedüs L. The Thyroid Nodule N Eng J Med 2004;351:1764-71. 2. . Cibas, Edmund S., and Syed Z. Ali. "The 2017 Bethesda system for reporting thyroid cytopathology." Thyroid 27.11 (2017): 1341-1346 3. Wang C, Friedman L, Kennedy GC, et al. A Large Multicenter Correlation Study of Thyroid Nodule Cytopathology and Histopathology. Thyroid 2011;21(3):243-251. 4. Patel KN, et al. JAMA Surg. 2018 5. Ali SZ, et al. Cancer Cytopathol. 2019. 6. Angell TE, et al. Front. Endocrinol. 2019

לפרטים נוספים: 1-700-700-922 | WWW.CTS.CO.IL